

آنے والی سردیوں

میں اپنے بچے

کو باحفاظت

رکھنا۔



سردی لگنا - جاننا کہ کیا کرنا ہے

ہو سکتا ہے کہ موسم سرما کے قریب آتے ہی ہم سب کو کھانسی اور نزلہ زکام متاثر کرے۔ چھوٹے بچے انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام ابھی نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔

یہ کتابچہ سردیوں کے دوران ہونے والے کچھ سب سے عام انفیکشنز کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا کہ کن علامات پر توجہ دینی چاہیے اور کون سا علاج دستیاب ہے۔

اگر آپ کبھی بھی اپنے بچے کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، تو اپنے فارماسسٹ، NHS 111 یا GP سرجری سے مشورہ لیں۔



اس موسم سرما میں اپنے بچوں کی حفاظت کے بارے میں اہم نکات

20
سیکنڈ



اپنے بچے کو دکھائیں کہ انفیکشن پھیلنے کے خطرے کو کیسے کم کیا جائے۔
انہیں 20 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا سکھائیں؛ کھانسی اور چھینکوں کے لیے ٹشو کا استعمال کریں؛ اور جب طبیعت ناساز ہو تو دوسروں سے دور رہیں۔



اپنے بچے کی نرسری یا اسکول کی مدد کریں یعنی اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہیں تو انہیں اسکول نہ بھیجیں یا اگر آپ کو اسکول نہ بھیجنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو ایسا ہی کریں۔
اس سے ان کے اسکول یا نرسری میں دوسروں کو انفیکشن منتقل ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔

کوئی بھی موسمی ٹیکے لگائیں جن کے لیے آپ کا بچہ اہل ہے۔

فلو نیسل ویکسین ہر سال مفت میں ستمبر سے بچوں کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ 4 سال

یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو یہ اسکول میں ہی لگا دی جائے گی۔ گھر سے آنے والے رضامندی کے فارم کو پر کریں۔ تمام بچے جن کی عمریں 2 اور 3 سال ہیں (بشرطیکہ وہ 31 اگست کو اس عمر کے ہوں) اپنی GP سرجری میں ویکسین حاصل کر سکتے ہیں - اپوائنٹمنٹ کے لیے ان سے رابطہ کریں۔

چیک کریں کہ آپ کا بچہ اپنی تمام ویکسینز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔

ویکسینیشن شدید بیماریوں کے خلاف بہترین دفاع ہے۔
آپ ان کی ریڈ بک چیک کر سکتے ہیں یا اپنی GP سرجری سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کا بچہ اپنی تمام ویکسینیشن کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔

رہ جانے والی ویکسین آپ کبھی بھی لگوا سکتے ہیں۔



عام بیماریاں اور ان سے کیسے نمٹا جائے

علاج	نشانیوں اور علامات	حالت/بیماری
<ul style="list-style-type: none"> پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مائع چیزیں زیادہ لیں۔ آرام کریں آپ کو عام طور پر طبی امداد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر طبیعت میں کوئی بہتری نہ ہو رہی ہو تو طبی امداد لیں 	<ul style="list-style-type: none"> اسہال اور/یا الٹی 	گیسٹرو اینٹرائٹس
<ul style="list-style-type: none"> اینٹی بائیوٹکس NHS 11 یا اپنی GP سرجری/نرس کے توسط سے فوری طبی تشخیص حاصل کریں 	<ul style="list-style-type: none"> جسم پر لال نشانات کے ساتھ ابھرے ہوئے چھوٹے دانے سفید جلد پر دانے گلابی یا سرخ نظر آتے ہیں، بادامی اور سیاہ جلد پر رنگ میں تبدیلی دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی لال نشان محسوس کر سکتے ہیں اور ابھرے ہوئے لال دانے دیکھ سکتے ہیں بخار گلے کی سوزش متلی اور الٹی 	اسکارلیٹ فیور
<ul style="list-style-type: none"> کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام طور پر 7 سے 10 دنوں کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے منہ کے چھالوں کے لیے مشورے اور علاج کے لیے فارماسسٹ سے بات کریں۔ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مائع چیزیں زیادہ لیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> ہاتھوں اور پاؤں پر ابھرے ہوئے لال دھبے منہ کے چھالے گلے کی سوزش بخار بھوک نہ لگنا 	ہاتھ، پاؤں اور منہ
<ul style="list-style-type: none"> پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مائع چیزیں زیادہ لیں۔ آرام کریں 	<ul style="list-style-type: none"> بخار سردی سے کانپنا سر درد پٹھوں میں درد کھانسی گلے کی سوزش بہتی ہوئی ناک 	زکام
<ul style="list-style-type: none"> پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مائع چیزیں زیادہ لیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے کولنگ کریم اور یا اینٹی ہسٹامائن دوائی استعمال کرنے کے بارے میں کسی فارماسسٹ سے بات کریں ibuprofen کا استعمال تب تک نہ کریں جب تک کہ ڈاکٹر ایسا کرنے کا مشورہ نہ دے، کیونکہ یہ جلد کے سنگین انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے 	<ul style="list-style-type: none"> جسم پر کسی بھی جگہ خارش، دھبے، جو چھالوں میں بدل جاتے ہیں اور پھر ان پر کھرند بن جاتا ہے زیادہ درجہ حرارت درد اور تکلیف، اور عام طور پر بیمار محسوس کرنا بھوک نہ لگنا 	چکن پاکس

اخراج کی مدت

آپ کے بچے کو اس وقت تک اسکول یا نرسری نہیں لوٹنا چاہیے جب تک کہ وہ 48 گھنٹے تک علامات سے پاک نہ ہو۔

تبصرے

گیسٹرو اینٹرائٹس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے nhs.uk/conditions/diarrhoea-and-vomiting وزٹ کریں



اینٹی بائیوٹک علاج شروع کرنے کے بعد آپ کا بچہ 24 گھنٹے بعد اسکول یا نرسری واپس جا سکتا ہے۔

سرخ رنگ کے بخار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے nhs.uk/conditions/scarlet-fever وزٹ کریں



آپ کے بچے کو اسکول یا نرسری سے چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ عام طور پر بیمار نہ ہو۔

باتھ، پاؤں اور منہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/conditions/hand-foot-mouth-disease



یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت تک اسکول یا نرسری سے دور رہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور بخار بالکل ختم نہ ہو جائے۔

فلو کے بارے میں مزید معلومات کے لیے nhs.uk/conditions/flu وزٹ کریں



براہ کرم بچوں کو نیسل فلو کی مفت ویکسین لگوانے پر غور کریں۔

چکن پاکس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/conditions/chickenpox



یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ اسکول یا نرسری سے اس وقت تک دور رہے جب تک کہ جسم کے تمام آبلے خشک ہوکر پیڑی نہ بن جائیں۔

یہ عام طور پر نشان کے ظاہر ہونے کے 5 دن بعد ہوتا ہے۔

ویکسینیشن آپ کے بچے اور اپنے اردگرد کے دیگر لوگوں کی حفاظت میں مدد کرتی ہے



• ویکسینیشن متعدی بیماری سے بچنے اور اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔

• ویکسین آپ کی کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کو بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے میں مدد دے کر تحفظ فراہم کرتی ہے۔

• ویکسینیشن محفوظ ہوتی ہیں اور متعارف کرائے جانے سے پہلے سخت حفاظتی جانچ سے گزرتی ہیں - مضر اثرات کے لیے بھی ان کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔

• ویکسینیشن ہلکے مضر اثرات کا سبب بن سکتی ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے - آپ خود کو تھوڑا سا بیمار محسوس کر سکتے ہیں اور 2 یا 3 دن تک آپ کے بازو میں درد ہو سکتا ہے۔

• ویکسینیشن ہر سال دنیا بھر میں 30 لاکھ تک اموات کو روکتی ہے۔



بیلتھ پروفیشنل سے بات کریں اگر:

- آپ خود کو یا اپنے بچے کو ویکسین لگوانے کے بارے میں فکر مند ہیں
- آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا آپ یا آپ کے بچے کو ویکسین لگ سکتی ہے
- آپ کے پاس ویکسین کے بارے میں کوئی اور سوالات ہیں

معمول کے بچپن کے حفاظتی ٹیکے

فروری 2022 سے

کب	بیماریوں سے محفوظ ہے۔	فراہم کردہ ویکسین
آٹھ ہفتے کی عمر میں	خناق، تشنچ، کالی کھانسی (کالی کھانسی)، پولیو، بيمو فيلس انفلونزا ٹائپ بی اور ہیپاٹائٹس بی (Hib)	DTaP/IPV/بیموفیلس انفلونزا ٹائپ بی/ہیپاٹائٹس بی
	میننگوکوکل گروپ بی (MenB)	MenB
	روٹا وائرس گیسٹرو اینٹرائٹس	روٹا وائرس
بارہ ہفتے کی عمر میں	خناق، تشنچ، کالی کھانسی، پولیو، بيمو فيلس انفلونزا ٹائپ بی اور ہیپاٹائٹس بی	DTaP/IPV/بیموفیلس انفلونزا ٹائپ بی/ہیپاٹائٹس بی
	نیوموکوکل (13 سپرو ٹائپس)	PCV
	روٹا وائرس	روٹا وائرس
سولہ ہفتے کی عمر میں	خناق، تشنچ، کالی کھانسی، پولیو، بيمو فيلس انفلونزا ٹائپ بی اور ہیپاٹائٹس بی	DTaP/IPV/بیموفیلس انفلونزا ٹائپ بی/ہیپاٹائٹس بی
	MenB	MenB
ایک سال کی عمر میں (بچے کی پہلی سالگرہ پر یا اس کے بعد)	MenC اور Hib	Hib/MenC
	نیوموکوکل	PCV بوسٹر
	خسرہ، ممپس اور رویلا (جرمن خسرہ)	MMR
	MenB	MenB بوسٹر
اہل اطفال کی عمر کا گروپ	انفلونزا (ہر سال ستمبر میں)	لائیو اٹینیویٹڈ انفلونزا ویکسین LAIV
تین سال چار ماہ یا اس کے فوراً بعد	خناق، تشنچ، کالی کھانسی اور پولیو	dTaP/IPV
	خسرہ، ممپس اور رویلا	MMR (پہلی خوراک چیک کریں۔ دیا)
بارہ سے تیرہ سال کے لڑکے اور لڑکیاں	مخصوص ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) اقسام کی وجہ سے ہونے والے کینسر اور جینیٹل وارٹس	HPV
چودہ سال کی عمر میں (اسکول کا 9 سال)	تشنچ، خناق اور پولیو	Td/IPV (MMR اسٹینڈس چیک کریں)
	میننگوکوکل گروپس A، C، W اور Y	MenACWY

